



IMPFKALENDER FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Impfungen	5-6 Jahre	9-17 Jahre
Diphtherie	Auffrischimpfung (nicht früher als 5 Jahre nach vorhergehender Dosis)	Auffrischimpfung (nicht früher als 5 Jahre nach vorhergehender Dosis)
Tetanus	Auffrischimpfung (nicht früher als 5 Jahre nach vorhergehender Dosis)	Auffrischimpfung (nicht früher als 5 Jahre nach vorhergehender Dosis)
Keuchhusten	Nachholimpfung für Ungeimpfte	Nachholimpfung für Ungeimpfte oder Auffrischimpfung
Kinderlähmung		Auffrischimpfung (nicht früher als 5 Jahre nach vorhergehender Dosis)
Hepatitis B		Nachholimpfung für Ungeimpfte (bis zum 18. Geburtstag)
Masern/Mumps/Röteln	Nachholimpfung für Ungeimpfte	Nachholimpfung für Ungeimpfte (bis zum 18. Geburtstag)
Windpocken		Impfung für Kinder von 9-17, die noch keine Windpocken hatten
Virus-Grippe	jährliche Impfung für Kinder mit chronischen Erkrankungen	jährliche Impfung für Kinder mit chronischen Erkrankungen
Gebärmutterhalskrebs		Impfung für Mädchen von 12-17 vor Beginn der sexuellen Aktivität

Quellen:

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut / Stand: Juli 2008; *Epidemiologisches Bulletin* 30/2008

Neuerungen in den aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI vom August 2008; *Epidemiologisches Bulletin* 31/2008

Impfung gegen Papillomaviren (HPV) für Mädchen von 12 bis 17 Jahren - Empfehlung und Begründung; *Epidemiologisches Bulletin* 12/2007