



IMPFKALENDER FÜR SÄUGLINGE UND KLEINKINDER

Impfungen	nach 2. Monat	nach 3. Monat	nach 4. Monat	11.-14. Monat	15.-23. Monat
Kombinationsimpfstoff gegen: Diphtherie Tetanus Keuchhusten Kinderlähmung Hepatitis B Haemophilus influenza Typ b (Hib)	erste Impfung	zweite Impfung	dritte Impfung	vierte Impfung	
Kombinationsimpfstoff gegen: Masern Mumps Röteln				erste Impfung	zweite Impfung
Windpocken				erste Impfung	zweite Impfung*
Pneumokokken	erste Impfung	zweite Impfung	dritte Impfung	vierte Impfung	
Meningokokken				Impfung nach 12. Monat	

* Bei Anwendung des Kombinationsimpfstoffs MMRV ist die Gabe einer zweiten Dosis gegen Varizellen erforderlich; zwischen beiden Dosen sollten vier bis sechs Wochen liegen.

Quellen:

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut / Stand: Juli 2008; Epidemiologisches Bulletin 30/2008

Neuerungen in den aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI vom August 2008; Epidemiologisches Bulletin 31/2008